

# 用藥指導單張 藍 10

## 膀胱抗膽鹼藥品

中文品名	英文品名	成分名	含量
歐舒緩釋錠	Oxibu	Oxybutynin	5 毫克
優若亭膜衣錠	Uridin	Tolterodine	2 毫克
益樂尿錠	Uroxate	Flavoxate	200 毫克
衛喜康膜衣錠	Vesicare	Solifenacin	5 毫克

1. 適應症：伴有急尿、頻尿、急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症
2. 服用方式：口服，可於飯前或飯後服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。

[歐舒緩釋錠] 為長效劑型，可剝半服用，但請勿磨粉或管灌。

3. 可能發生的副作用：口乾、便秘、腹瀉、尿滯留、視力模糊、頭痛、暈眩等。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應 (疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。
2	嚴重暈眩、無法入睡、語言障礙、情緒變化、平衡感異常、出現幻覺、記憶力改變、意識混亂或失去意識。
3	無法排尿導致膀胱很脹。
4	泌尿道感染症狀：排尿時有灼燒感或疼痛。

#### 4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

請續閱背面

- (2) 此類藥可能會影響注意力，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。
- (3) 青光眼患者服藥期間請定期回眼科檢查，注意眼壓變化。
- (4) 此類藥品可能會影響排汗功能，於高溫環境需注意中暑現象。
- (5) 老年人服用此類藥品副作用發生的機率較高，請注意自身服藥反應。
- (6) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138