

用藥指導單張 藍 11

中文品名：貝坦利持續性藥效錠	英文品名：Betmiga P.R
成分名：Mirabegron	含量：50 毫克

1. 適應症：治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。
2. 服用方式：口服。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
此藥品為長效劑型，應整粒配水吞服，不可咀嚼、剝半、磨粉或管灌。
3. 可能發生的副作用：高血壓、頭痛、頭暈、心跳過快、口乾、便秘、腹瀉、泌尿道感染、尿滯留、鼻咽炎、背痛、關節痛。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍； 痛：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。
2	泌尿道感染：血尿、排尿灼熱或疼痛、發燒、下腹部或骨盆腔疼痛。
3	無法排尿導致膀胱很脹。
4	血管性水腫，症狀包括：臉、嘴唇、舌頭或喉頭腫脹、呼吸或吞嚥困難。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 服用此藥可能會影響血壓，高血壓患者須注意血壓變化。

(3) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138