

# 用藥指導單張 紅 3

## 利尿劑

中文品名	英文品名	成分名	含量
必得寧	Busix	Bumetanide	1 毫克
舒利諾	Furide	Furosemide	40 毫克
使排通	Spironolactone	Spironolactone	25 毫克
服爾伊德安	Fluitran	Trichlormethiazide	2 毫克
脈利舒[複方]	Moreez	Perindopril/Indapamide	4 毫克/1.25 毫克
可得安穩[複方]	Co-Diovan	Valsartan/Hydrochlorothiazide	80 毫克/12.5 毫克
可汎穩壓[複方]	Co-Vosaa	Valsartan/Hydrochlorothiazide	80 毫克/12.5 毫克
好悅您[複方]	Hyzaar	Losartan/Hydrochlorothiazide	50 毫克/12.5 毫克

1. 適應症：利尿、高血壓、心衰竭。
2. 服用方式：口服；請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：高尿酸血症、電解質(鉀、鎂)不平衡、頭暈、頭痛、噁心、抽筋、光敏感現象。
4. ㊟ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	電解質不平衡之症狀：精神錯亂、肌肉疼痛、癲癇發作、非常疲倦或虛弱。
3	高血糖症狀：意識混亂、口渴、頻尿、呼吸加快等。
4	四肢腫脹、麻木或顏色改變。
5	呼吸短促或困難、咳血、不明瘀血。

請續閱背面

⊗ 若服用下列藥物出現對應症狀時，請立即回診就醫：

[使排通]：男性性功能障礙、乳房疼痛、月經失調。

[舒利諾]：體重不正常增加、視力模糊、聽力改變。

#### 5. 注意事項：

- (1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：  
曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。
- (2) 請定期回診抽血檢查相關數值。
- (3) 服藥期間禁止哺乳。
- (4) 曾對磺胺類藥品過敏者請主動告知醫(藥)師。
- (5) 建議避免睡前服藥，避免夜間如廁造成危險。
- (6) 禁止飲酒，避免造成低血壓的發生。
- (7) 如您要進行手術，請告知醫師有在服用此類藥品。
- (8) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

#### 6. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138