

# 病人用藥指導單張

## 鼻用噴劑

商品名：Besonin 碧適清鼻腔定量噴液劑

### 一、使用步驟



#### 步驟一

搖勻鼻噴劑，直立取下保護蓋。



#### 步驟二

垂直拿著鼻噴劑，並把噴嘴向外。將食指與中指置於噴嘴頸上方的兩側，拇指則置於瓶底下。拇指保持不動，食指與中指壓下噴嘴頸已釋放細微的噴霧至空中，**首次使用請壓數次(6-10次)直到出現薄霧(如左圖)**，此時鼻噴劑已可供使用。



#### 步驟三


先擤鼻以清潔鼻孔。再用手指壓住其中一個鼻孔，並將噴嘴小心地放進另一邊鼻孔。用鼻吸氣的同時請按壓噴嘴頸。用口呼氣，再換另一邊鼻孔用藥。

#### 步驟四

使用完畢請用乾淨的紙巾或手帕擦拭噴嘴，並將保護蓋蓋回鼻噴劑。

### 二、注意事項

- 請定期清潔鼻噴劑，以免噴嘴堵塞。請依下列步驟清潔：
  - 取下保護蓋
  - 向上拔出白色鼻用噴嘴(如右圖)
  - 以溫水清洗塑膠部分
  - 甩掉多餘水份並風乾
  - 將噴嘴放回鼻噴劑上，下次使用前須先對空噴一次之後才可使用。
- 請依醫師指示之劑量定時定量使用，勿自行調整劑量。
- 若非每日使用，使用前請先壓 1 次。



### 三、儲存方式

藥品應置於兒童不易拿取的地方，將藥品儲存於室溫，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)並避免陽光直射。過期或不再需要的藥品應丟棄。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138