

病人用藥指導單張 Premarin 普力馬林

成分：Conjugated estrogen

[濃度 0.625mg/g, 一條藥膏 14g]

商品名：Premarin 普力馬林陰道乳膏

一、適應症

萎縮性陰道炎及更年期性外陰萎縮症

二、使用方式

請遵照醫師指示劑量(克 g 數)使用

內附塗藥管上有劑量刻度 [0.5] [1.0] [1.5] [2.0]

藥品仿單建議使用週期是使用三周，休息一周

實際使用方式請遵照醫師指示

三、注意事項

1. 有以下病史者請主動告知醫師，不建議使用本藥：
動脈栓塞、深層靜脈栓塞、肺栓塞、乳癌、婦科癌
2. 使用期間若有不正常陰道出血的情況請回診
3. 懷孕和哺乳婦女禁止使用
4. 使用過後請洗淨雙手，避免他人碰觸到藥物

四、副作用

陰道出血、乳房疼痛、噁心、嘔吐、頭痛

五、藥品儲存方式：室溫保存

六、使用步驟



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138

PREMARIN® 普力馬林® 陰道乳膏
(conjugated estrogens)
VAGINAL CREAM
in a nonliquefying base

陰道乳膏使用圖解

- 1 打開軟膏管蓋子
- 2 將塗藥器拴緊在軟膏管嘴上
- 3 壓幾軟管使軟膏依所需劑量壓入塗藥管內
- 4 將塗藥器旋開
- 5 先躺下再拉起錶蓋，然後將裝了藥膏的塗藥器輕輕的插入陰道深部，再推動推管將藥膏完全推入陰道內
- 6 使用後的塗藥器可將推管及容器分開，用少許的肥皂和溫水沖洗

Pfizer Pfizer Limited
輝瑞大藥廠股份有限公司

修訂日期：107 年 6 月 28 日