

病人用藥指導卡

耳用滴劑

商品名：Mycomb otic drops 美康耳用滴劑
Siproxan 舒耳爽耳用滴劑
Tarivid 泰利必妥點耳液

一、作用

治療耳部及周圍皮膚的細菌感染或黴菌感染。

二、使用步驟

- 1.請先將雙手洗淨。
- 2.用紙巾將耳朵清潔、擦乾，不要使用肥皂清潔耳朵。
- 3.請先將耳用滴劑振搖均勻，用手握住耳用滴瓶數分鐘，使溫度接近體溫。
- 4.採取側躺或坐姿，頭部傾斜約 45 度，患耳朝上，打開瓶蓋，將耳朵向後上方拉緊並貼僅頭部(嬰兒則往後下方拉)，依照醫師指示的用量將耳滴劑滴入外耳道內。
- 5.保持相同姿勢約 5 分鐘，可以吞口水、壓耳珠或耳朵往後上方拉(嬰兒則往後下方拉)，這樣可以幫助藥品流入耳朵內。

三、注意事項

- 1.開封後一個月，未使用完的藥品請丟棄。
- 2.發現忘記點藥時，應盡快補點，若接近下一次點藥才想起忘記點上一劑，則跳過該劑量，按正常的劑量與時間點藥，不要多補一個劑量。

四、儲存方式

藥品應置於兒童不易拿取的地方，將藥品儲存於室溫，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)並避免陽光直射。過期或不再需要的藥品應丟棄。

成人耳朵向後上方拉



圖：江柏宏繪製

輕壓耳珠數次使藥水流入

保持相同姿勢約 5 分鐘後，再將頭傾斜另一邊，使藥水流出擦乾



新 北 市 立 聯 合 醫 院
藥 劑 科 謹 製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：
三重院區(02)2982-9111 分機 3189
板橋院區(02)2257-5151 分機 2138