

用藥指導單張 黃 10

DPP-4 抑制劑

中文品名	英文品名	成分名	含量
佳糖維	Januvia	Sitagliptin 100mg	100 毫克
糖漸平	Trajenta	Linagliptin 5mg	5 毫克
高糖優美	Galvus Met	Vildagliptin/Metformin [複方：兩種成分]	50 毫克/ 500 毫克

1. 適應症：治療第二型糖尿病
2. 服用方式：口服，可於飯前或飯後服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：類似感冒的症狀、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、低血糖。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應(皮膚紅癢、起疹子或脫皮等)
2	嚴重腹痛或背痛、胃部不適、嘔吐
3	嚴重關節疼痛或是關節疼痛持續未好轉

⊗ 若服用下列藥物出現對應症狀時，請立即回診就醫：

[佳糖維]：排尿量改變、尿中帶有血色、下肢水腫、呼吸急促或體重大幅增加
[糖漸平]：下肢水腫、呼吸急促或體重大幅增加
[高糖優美]：尿液成茶褐色、皮膚或眼球呈變黃、疲倦、沒有食慾

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

請續閱背面

- (2) 發生低血糖時請勿開車，以避免危險。
- (3) 服藥期間應遵醫囑控制飲食、規律運動，並定時自我監測血糖以及定期回診抽血檢驗。
- (4) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138