

## 用藥指導單張 黃 6

中文品名：福適佳	英文品名：Forxiga
成分名：Dapagliflozin	含量：10 毫克

### 1. 適應症：

- (1) 血糖控制：第二型糖尿病。
- (2) 預防心血管事件：用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病或多重心血管風險因子的成人病人時，可降低心衰竭住院的風險。
- (3) 心衰竭：用於心衰竭(NYHA 分類第二至四級) 且心室射出分率降低( $\leq 40\%$ )的成人時，可降低心血管死亡和心衰竭住院的風險。

2. 服用方式：飯前飯後服用皆可，建議可於早上服藥。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。

3. 可能發生的副作用：生殖器黴菌感染、鼻咽炎、泌尿道感染、背痛、排尿增加、排尿不適/疼痛、噁心、肢體疼痛。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	排尿困難、尿液量改變、體重大幅增加。
3	意識混淆、肌肉疼痛或無力、心跳過快或不正常、呼吸急促、嚴重頭暈或暈厥、疲倦虛弱、口乾、眼乾、嚴重胃部不適、嘔吐。
4	血尿、排尿疼痛、頻尿、尿急、發燒、下腹痛、骨盆疼痛。
5	陰道：搔癢、有分泌物；陰莖：疼痛、腫脹、皮疹、有分泌物。
6	生殖器或會陰區域疼痛或壓痛、紅斑或腫脹並伴隨發燒或身體不適。

### 4. 注意事項：

- (1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

請續閱背面

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

- (2) 此藥品有利尿作用，請攝取足量水分以避免體液流失，尤其在天氣炎熱、外出活動或生病有嘔吐或腹瀉的期間；體液流失過多及水分攝取不足可能會引起腎臟問題或泌尿道感染。
- (3) 請作好私密處的衛生與保養，注意是否有疼痛感染之情形發生。
- (4) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

#### 5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138