

用藥指導單張 黃 3

中文品名：抵克醣錠	英文品名：Deglu
成分名：Acarbose	含量：50 毫克

1. 適應症：非胰島素依賴型糖尿病之治療。
2. 服用方式：建議於用餐的第一口時服用；請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：胃脹氣、腹瀉、腹痛、噁心。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍； (痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	由輕度低血糖症狀(飢餓、虛弱、發抖、心跳加快或出汗)發展至反應遲鈍、口齒不清、焦躁不安、意識混亂，甚至喪失意識與昏迷。
3	疲倦、食慾降低、嘔吐、糞便顏色淺、尿液呈深褐色、皮膚或眼睛發黃。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 若未進食請勿服用此類藥品。

(3) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138