

用藥指導單張 黃 1

磺醯尿素類藥品(Sulfonylureas)

中文品名	英文品名	成分名	含量
代蜜 [長效錠]	Diamin MR	Gliclazide	30 毫克
速糖淨 [長效錠]	Kludone MR		60 毫克
革理蔓錠	Glimaryl	Glimepiride	2 毫克
固利康錠	Gliben	Glibenclamide	5 毫克
美爾胰錠 [複方]	Amaryl M	Glimepiride/Metformin	2 毫克/500 毫克
克糖美錠 [複方]	GlucoMet	Glibenclamide/Metformin	5 毫克/500 毫克
糖安安錠 [複方]	Safemat	Glimepiride/Metformin	2 毫克/500 毫克

- 適應症：第二型糖尿病
- 服用方式：口服。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
[長效錠] 可剝半服用，請勿磨粉或管灌。
- 可能發生的副作用：低血糖、體重增加、腸胃不適、噁心、頭暈、頭痛。
⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍； (痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	嚴重低血糖：頭暈、頭痛、虛弱、心跳加快、意識模糊、昏厥。
3	茶褐色尿液、皮膚或眼球呈變黃、無食慾。
4	持續性的虛弱、疲倦。
5	持續性的呼吸困難、水腫、關節或肌肉疼痛、不明的瘀青或出血。
6.	意識混亂、癲癇發作。

請續閱背面

4. 注意事項：

- (1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。
- (2) 請定期自我監測血糖，以便醫師評估您的病情。
- (3) 此類藥品具有光敏感性，服藥期間做好防曬。
- (4) [美爾胰錠]、[克糖美錠]、[糖安安錠]初期使用可能會有輕微的腸胃不適，可於用餐時或餐後立即服用以減少不適感。
- (5) 此類藥品對於患有 G6PD 缺乏(蠶豆症)之病人具有高度風險會導致溶血反應，請主動告知醫師評估。
☹ 溶血反應症狀：臉色蒼白、全身黃疸、精神不佳、食慾差及解深茶色尿、呼吸窘迫、心臟衰竭、休克及意識昏迷。
- (6) 曾對磺胺類藥品過敏者請主動告知醫師評估。
- (7) 服用[美爾胰錠]、[克糖美錠]、[糖安安錠]者，若需注射含碘顯影劑進行檢查，請主動告知醫師有服用此類藥品，以評估注射前是否需要停藥或注射後是否需要停藥 48 小時。
- (8) 若安排任何需禁食至少 8 小時以上的檢查(如：大腸鏡檢)，為避免低血糖之風險，禁食期間請暫停服用此類藥品。
- (9) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138