

用藥指導單張 紅 12

中文品名：阿普利素寧糖衣錠	英文品名：Apresoline
成分名：Hydralazine	含量：25mg

1. 適應症：高血壓。
2. 服用方式：請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：頭痛、胸痛、心悸、水腫、噁心、嘔吐、腹瀉。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍； (痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	類紅斑性狼瘡(SLE)徵候群：臉頰、身體出現皮疹、容易曬傷、肌肉或關節痛、胸痛、呼吸急促、手臂或腿部腫脹。
3	周圍神經炎：手或腳麻木、刺痛、疼痛或無力。
4	排尿不正常、嚴重頭暈或暈厥、胸痛、快速或不正常的心跳。
5	發燒，寒顫或喉嚨痛、不明原因的瘀傷或出血；容易感到疲倦或虛弱。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 在未確定藥物如何影響您之前，避免開車或操作需要專注及注意力之行為。

(3) 為降低感到頭暈或暈眩的機會，如果您一直坐著或躺著，請緩慢起身並小心上下樓梯。

(4) 長期使用本藥品應依醫囑指示進行抽血檢查。

請續閱背面

- (5) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。
- (6) 患有心臟冠狀動脈阻塞疾病者須謹慎使用，請主動告知醫師評估，服藥期間注意是否有胸痛或呼吸困難的症狀發生。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138