

用藥指導單張 紅 9

Statins 【降血脂類藥品】

中文品名	英文品名	成分名	含量
柔脂	Atorcal	Atorvastatin	10 毫克
善脂瑩	Anxolightor		20 毫克
益脂可[長效錠]	Lescol XL	Fluvastatin	80 毫克
脂樂潔	Pratin	Pravastatin 40mg	40 毫克
普脂芬	Pravafen	[兩種成分] Pravastatin / Fenofibrate 160mg	40 毫克/ 160 毫克
脂必妥	Pitavol	Pitavastatin	2 毫克
力脂替	Pitarty		4 毫克
冠脂妥	Crestor	Rosuvastatin	10 毫克
利降脂	Rosulator		
維妥力	Vytorin	[兩種成分] Simvastatin / Ezetimibe 10mg	20 毫克/
愛脂停	Agitin		10 毫克

- 適應症：高脂血症、高膽固醇血症
- 服用方式：口服。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
- 可能發生的副作用：頭痛、頭暈、噁心、肌肉疼痛、關節痛、痠痛無力。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：⊗：皮膚紅疹、搔癢或水泡；⊗：口腔或黏膜潰瘍； ⊗：喉嚨痛；⊗：眼睛紅腫、灼熱；⊗：眼睛、嘴唇腫；⊗：發燒
2	血尿，排尿時疼痛，常有尿意或常排尿，發燒，下腹痛。
3	無法排尿或體重大幅增加
4	持續性的不正常的肌肉疼痛，壓痛或無力
5	皮膚或眼睛發黃，糞便顏色變淺，非常疲倦，食慾不振等。

請續閱背面

⊗ 若服用下列藥物出現對應症狀時，請立即回診就醫：

[柔脂、善脂瑩]：曾經發生中風或短暫性腦缺血之患者，請注意身體是否有發生單側無力，說話困難，平衡失調，臉部單側下垂或視力模糊等再次中風之症狀。

[脂樂潔、普脂芬]：胸痛、視力改變

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 需遵循醫囑控制飲食和規律運動，並密切注意血脂、血糖，定期抽血檢驗。

(3) 應避免食用、飲用柑橘柚類水果與製品，例如葡萄柚、柚子、檸檬、橘子、柳丁等。

(4) 和含鋁或鎂的制酸劑需要間隔兩個小時使用。

(5) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138