

用藥指導單張 紅 6

血管收縮素受體阻斷劑(ARB)

中文品名	英文品名	成分名	含量
博脈舒	Blopress	Candesartan	8 mg
可得安穩	Co-Diovan	Valsartan/Hydrochlorothiazide	80 mg/12.5 mg
可汎穩壓	Co-Vosaa	Valsartan/Hydrochlorothiazide	80 mg/12.5 mg
得安穩	Diovan	Valsartan	160 mg
易安穩	Exforge	Valsartan/Amlodipine	160 mg/5 mg
易德壓悅 5/160 毫克	Exnortan 5/160	Valsartan/Amlodipine	160 mg/5 mg
易德壓悅 5/80 毫克	Exnortan 5/80	Valsartan/Amlodipine	80 mg/5 mg
健安心	Entresto	Valsartan /Sacubitril	51.4mg/48.6mg
好悅您	Hyzaar	Losartan/Hydrochlorothiazide	50 mg/12.5 mg
抑爾壓	Ibesaa	Irbesartan	150 mg、300 mg
必康平	Micardis	Telmisartan	80 mg
雅脈	Olmetec	Olmesartan	20 mg
舒脈康	Sevikar	Olmesartan/Amlodipine	20 mg/5 mg
柔舒坦	Zosatan	Losartan	50 mg

- 適應症：高血壓、心衰竭、第二型糖尿病腎病變
- 服用方式：口服，請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
- 可能發生的副作用：頭暈、頭痛、上呼吸道感染、鼻塞、鼻炎、咳嗽、腰酸背痛、低血壓、周邊水腫、腹瀉、疲倦。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；
---	----------------------------------

請續閱背面

	(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	排尿不正常、血尿、體重大幅減輕。
3	嚴重頭暈、暈厥、手臂或腿部腫脹。
4	高血鉀症狀：心律不整、意識改變、虛弱、頭暈、頭昏眼花、呼吸急促。

(⊖) 若服用下列藥物出現對應症狀時，請立即回診就醫：

[雅脈 Olmetec、舒脈康 Sevikar]：嚴重或慢性腹瀉、體重大幅減輕。
[好悅您 Hyzaar、可得安穩 Co-Diovan、可汎穩壓 Co-Vosaa]：視力改變、眼睛疼痛、高血糖症狀。
[舒脈康 Sevikar、易安穩 Exforge、易德壓悅 Exnortan]：胸痛發作或加劇、肌肉僵硬或晃動、肝功能異常。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 使用含有 Hydrochlorothiazide 成分的 Hyzaar、Co-Diovan、Co-Vosaa，糖尿病病人要注意血糖變化、可能會誘發痛風發作及狼瘡發作或惡化。

(3) 使用含有 Amlodipine 成分的 Sevikar、Exforge、Exnortan 服藥期間避免食用柚類的水果或果汁，可能會造成藥效過強。

(4) 這類藥物可能造成血中鉀離子升高，若有食用富含鉀鹽的飲食、或服用保鉀利尿劑或含鉀產品，請主動告知醫生。

(5) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138