

用藥指導單張 紅 2

中文品名：隆我心錠	英文品名：Lanoxin
成分名：Digoxin	含量：0.25 mg

- 適應症：心臟衰竭、心房撲動、心房纖維顫動、陣發性上室性心搏過速。
- 服用方式：口服，可飯前或飯後服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
- 可能發生的副作用：頭暈或頭痛、腹痛、視力模糊、皮疹、噁心嘔吐

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	嚴重頭暈或暈倒。
3	嚴重嘔吐、或是嘔血或咖啡色物體。
4	嚴重腹瀉。
5	視力模糊、黃色視覺，或是在光線的周圍看見光暈或光環。
6	心跳異常。
7	幻覺（看到或聽到不存在的事物）。
8	糞便呈深棕、黑，或帶血。
9	乳房增大。
10	影響判斷力或行為方式改變。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 按照醫生的指示檢查血壓和心率。

請續閱背面

- (3) 開車、操作機器或參與具危險性的活動應小心。
- (4) 將藥物放在兒童拿不到的地方，誤食可能導致兒童死亡。
- (5) 計畫使用高纖或高麩皮飲食法前先和醫師討論。
- (6) 使用此藥可能會造成電解質的改變，請注意避免攝取過多以下的食物：
香蕉、楊桃、空心菜、牛奶、奶製品、紫菜、堅果。
- (7) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，
只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138