

用藥指導單張 紫 11

中文品名：佑汝	英文品名：Gestrin
成分名：Gestrinone	含量：2.5 毫克

1. 適應症：子宮內膜異位。
2. 服用方式：口服，一般用量為每週二次，每次服用一顆。於月經週期第一天服用一顆，三天後服用第二顆，此後固定於每週的相同二天，且最好於相同時間服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。

服藥後請於下表勾選紀錄用藥，避免忘記服藥或過量服藥，幾月幾日請自行填寫。

日期	/	/	/	/	/	/	/
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
服藥打勾							
日期	/	/	/	/	/	/	/
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
服藥打勾							

3. 可能發生的副作用：產生斑點、粉刺、體重增加、食慾改變、熱潮紅、頭痛、神經過敏、胃部不適、抑鬱。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍； (痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
---	---

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

請續閱背面

- (2) 本藥品不是避孕藥，不可作為避孕用途。服用此藥期間若需避孕，請選擇非口服藥品的方式避孕，如：保險套。
- (3) 若有糖尿病、心臟、腎臟或肝臟疾病，請告知您的醫師評估。
- (4) 可能會造成性慾、乳房大小、聲音的改變，體毛增加、水腫等少見副作用，若有發生上述症狀請告知醫師。
- (5) 若忘記服藥一次，請於發覺時立即服用一次藥量，並持續每周二次服藥。如果忘記二次或更多次，則停止服藥並安排回診。如果誤服過多劑量，應立即回診。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138