

用藥指導單張 紫 15

中文品名：保骼麗注射液	英文品名：Prolia
成分名：Denosumab	含量：60 毫克

1. 適應症：治療有高度骨折風險之骨質疏鬆症停經後婦女或男性患者。
2. 服用方式：此藥品為注射劑型，請由醫護人員施打。
一般建議施打劑量為每 6 個月一次皮下注射單劑 60 毫克，施打部位可以是上臂、大腿或腹部。
3. 可能發生的副作用：周邊水腫、低血鈣症、感染、皮膚反應(皮膚炎、皮疹、濕疹)、顎骨壞死、背痛、四肢疼痛、肌肉骨骼疼痛。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	出現皮膚、胃下部(腹部)、膀胱或耳朵的嚴重感染。持續性的症狀包括：發燒寒顫、皮膚紅腫熱痛、呼吸急促、嚴重腹痛、頻繁排尿或排尿時有燒灼感。
3	部分患者曾發生股骨異常骨折。骨折症狀包括髖部、腹股溝或大腿出現新的或異常疼痛。
4	低血鈣症狀，如：肌肉痙攣、抽搐或抽筋手指、腳趾或嘴巴周圍麻木或刺痛。
5	四肢或下巴持續性的腫脹或疼痛。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、

請續閱背面

懷孕或計畫懷孕或哺乳。

- (2) 此藥品可能會傷害胎兒，從治療期間直到最後一劑打完後至少 5 個月內，都必須使用有效的避孕方法。
- (3) 此藥品治療期間應每天補充 1000 毫克的鈣質與至少 400 IU 的維生素 D，或遵從醫師建議的用量補充。
- (4) 由於此藥品有發生顎骨壞死的風險，施打此藥期間建議可定期安排牙科檢查，維持口腔衛生，避免侵入性的牙科處置，如：拔牙、植牙或口腔手術，或遵從醫師安排的口腔照護計劃。
- (5) 如果漏打一劑，應於方便時儘快施打。之後再從最後一次注射的日期算起，排定每 6 個月一次的注射時間。

5. 藥品保存：

此藥品需冷藏(2-8°C)，領藥後請盡速交付給醫療人員施打。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138