

用藥指導單張 紫 20

中文品名：基利克膜衣錠	英文品名：Glivec
成分名：Imatinib mesylate	含量：100 毫克

1. 適應症：慢性骨髓性白血病患者。

治療成年人無法手術切除或轉移的惡性胃腸道基質瘤。

2. 服用方式：口服，配合一大杯水於餐中服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。

對於無法吞服藥錠之病人，可將藥錠泡在一大杯水或蘋果汁中，待藥錠崩散後，攪拌均勻立即服用，服用完畢後將容器清洗乾淨。

3. 可能發生的副作用：由於此藥品屬於抗癌標靶藥品，發生副作用的機率較高，請密切注意自身症狀，若有任何持續且無法忍受的副作用請回診就醫。

胸痛、水腫、禿頭、皮膚反應(紅疹、搔癢)、體重增加、腹痛、便秘、腹瀉、腸胃脹滿不快感、骨髓毒性(貧血、血小板或白血球過低)、感染、虛弱、頭痛、暈眩、無力、肌肉僵直、上呼吸道症狀等。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：⊗：皮膚紅疹、搔癢或水泡；⊗：口腔或黏膜潰瘍； ⊗：喉嚨痛；⊗：眼睛紅腫、灼熱；⊗：眼睛、嘴唇腫；⊗：發燒
2	異常出血：咳血、尿液或糞便中有血、莫名瘀青、流血不止。
3	電解質異常症狀：肌肉無力、疼痛，癲癇、心跳異常、精神錯亂。
4	腎臟異常症狀，如無法排尿、尿量改變、血尿或體重增加過多。
5	感染症狀，如發燒、發冷、咽喉痛、耳朵或鼻竇疼痛、咳嗽、痰多或痰液顏色改變、口腔潰瘍或傷口無法癒合。
6	嚴重皮膚不良反應：皮疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮、迅速擴散的腫脹等情形。

請續閱背面

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 服藥期間免疫力降低，養成洗手和配戴口罩的好習慣，避免生食。

(3) 在不確定藥品是否會影響注意力之前，避免駕駛或其他需要集中注意力的工作。

(4) 接種任何疫苗之前，請先告知醫生有在使用此藥。服藥期間若接種某些疫苗可能會增加感染風險或導致疫苗無法發揮作用。

(5) 服藥期間注意是否有異常出血狀況，避免受傷，使用軟毛牙刷、電動刮鬍刀。

(6) 服藥期間可能會有體液蓄積的副作用，注意體重變化，若有體重超乎預期地增加情形，請回診就醫。

(7) 心衰竭病人服用此藥須密切地評估，若出現呼吸急促，體重增加過多，心跳不正常或手臂或腿部出現新的或更嚴重的腫脹，請回診就醫。

(8) 有在服用心血管用藥或是抗凝血藥物的患者請先主動告知醫師或藥師，確保無藥物交互作用之影響。

(9) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138