

# 用藥指導單張 紫 24

## 口服一線抗結核病藥品

1. 服用方式：為達最佳治療效果，通常會服用多種抗結核病藥品，請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
2. 可能發生的副作用：以下為每種藥品都有的常見副作用
  - (1) 肝炎：醫師會為您監測肝指數，肝炎的症狀包括：全身倦怠、食慾不振、噁心、腸胃不適、嘔吐、右上腹痛、深色尿、眼睛或皮膚變黃等。
  - (2) 皮膚反應：包括紅疹、搔癢等，一般來說開始服藥後約兩週內會自行減緩或消失，有需要可服用抗組織胺藥品來緩解症狀。
  - (3) 類流感症狀：包括疲倦、虛弱、肌肉痠痛等，若嚴重影響生活品質請告知醫師。
  - (4) 腸胃不適：包括厭食、噁心、嘔吐、腹瀉等，一般來說開始服藥後約兩週內會自行減緩或消失，若症狀較嚴重者，可在醫師同意下改為飯後與食物併服或睡前服藥，或是請醫師開立腸胃藥減緩腸胃不適。
  - (5) 下表為各種抗結核病藥品成分可能發生的特殊副作用：

縮寫	藥品成分	需注意的副作用	注意事項
<b>INAH</b>	Isoniazid	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 常見：周邊神經炎(肢端麻木或刺痛感)</li><li>2. 少見：痙攣、視神經炎、類狼瘡症候群、過敏反應</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 空腹服用，食物會影響吸收。</li><li>2. 醫師會視情況開立維他命 B6 給您服用以預防周邊神經炎。</li><li>3. 服藥期間請避免食用過多的起司或飲酒，可能會導致嚴重高血壓。</li></ol>
<b>RMP</b>	Rifampicin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 常見：白血球下降、血小板下降</li><li>2. 少見：溶血性貧血(深色尿、暈眩、呼吸困難)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 空腹服用，食物會影響吸收。</li><li>2. 眼淚、唾液和排尿會呈現橘紅色，隱形眼鏡會被染色。</li><li>3. 服藥期間若同時服用避孕藥可能會失效，請作好額外的避孕措施。</li></ol>
<b>PZA</b>	Pyrazinamide	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 常見：高尿酸血症</li><li>2. 少見：關節痛、血糖升高</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 空腹飯後皆可，食物不影響吸收。</li><li>2. 痛風患者須注意痛風發作情形。</li><li>3. 糖尿病患者須注意血糖變化。</li></ol>
<b>EMB</b>	Ethambutol	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 常見：眼球後視神經炎(視力模糊、中央盲點及紅綠色盲)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 空腹飯後皆可，食物不影響吸收。</li><li>2. 若發現有視力模糊或減退之情形，請盡快回診。</li></ol>

請續閱背面

		2. 少見：高尿酸血症	3. 痛風患者須注意痛風發作情形。
<b>RFB</b>	Rifabutin	1. 常見：白血球下降、血小板下降 2. 少見：眼睛葡萄膜炎、眼球沉積物	1. 空腹飯後皆可，食物不影響吸收。 2. 眼淚、唾液和排尿會呈現橘紅色，隱形眼鏡會被染色。 3. 服藥期間若同時服用避孕藥可能會失效，請作好額外的避孕措施。
<b>RPT</b>	Rifapentine	1. 常見：貧血、白血球下降、血小板下降 2. 少見：結膜炎	1. 與餐併服。 2. 眼淚、唾液和排尿會呈現橘紅色，隱形眼鏡會被染色。 3. 服藥期間若同時服用避孕藥可能會失效，請作好額外的避孕措施。

(6) 若有下列過敏反應，請立即回診就醫：

Ⓢ：皮膚紅疹、搔癢或水泡；Ⓣ：口腔或黏膜潰瘍；Ⓜ：喉嚨痛；Ⓡ：眼睛紅腫、灼熱；Ⓢ：眼睛、嘴唇腫；Ⓝ：發燒。

### 3. 注意事項：

抗結核病藥品的藥品交互作用複雜，請諮詢藥師以確認目前的服藥和抗結核藥品交互作用的影響。

### 4. 院內抗結核病藥品項目：若您不清楚此次處方服用的藥品為何，請諮詢藥師

	中文品名	英文品名	成分縮寫對照上表	每顆含量
<input type="checkbox"/>	易復癆錠	Epbutol	EMB	400 毫克
<input type="checkbox"/>	異菸(生僉)醯肼錠	Isoniazide	INH	100 毫克
<input type="checkbox"/>	肺挺膜衣錠	Priftin	RPT	150 毫克
<input type="checkbox"/>	匹井梭安錠	Pyrazinamide	PZA	500 毫克
<input type="checkbox"/>	衛肺特糖衣錠	Rifater	RMP/INH/PZA	120/80/250 毫克
<input type="checkbox"/>	樂肺寧 150	Rifinah 150	RMP/INH	150/100 毫克
<input type="checkbox"/>	樂肺寧 300	Rifinah 300	RMP/INH	300/150 毫克
<input type="checkbox"/>	立汎黴素膠囊	Rifampicin	RMP	150 毫克
<input type="checkbox"/>	立汎黴素膠囊	Rifampicin	RMP	300 毫克
<input type="checkbox"/>	利肺寧膠囊	Rifampicin	RMP	450 毫克



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138