




用藥指導單張

中文品名：阿腸克浣腸劑	英文品名：Colasa Enema
成分名：Mesalazine	含量：2g/100mL

1. 適應症：潰瘍性結腸炎，輕度到中度之直腸炎及直腸乙狀結腸炎
2. 使用劑量：直腸給藥，每日 1 次夜間使用 1-2 瓶，請遵照醫囑使用。
3. 使用方式：步驟如下
 - (1) 使用前，先將浣腸劑置於溫水中約 10 分鐘，使其接近體溫之溫度。
 - (2) 使用前，先將浣腸劑振搖均勻再使用。
 - (3) 建議浣腸劑於睡前使用，除非醫師有特別指示。
 - (4) 打開瓶蓋後，將所附插管插在瓶口上旋緊。
 - (5) 使用前建議用少許凡士林塗在浣腸劑之插管上。
 - (6) 請採用側臥姿勢，慣用側那腳彎曲，另一腳伸直。



- (7) 將浣腸劑的插管輕輕地塞入肛門，並慢慢推進至瓶蓋口為止。
 - (8) 將藥液慢慢地完全擠進肛門內（至少一分鐘）。
 - (9) 確定藥液完全灌入後，將藥瓶保持完全擠壓之現狀下拔出，並連瓶丟棄之。
 - (10) 為確保浣腸劑能滯留體內，病人應維持相同姿勢 5-10 分鐘，儘量於第二天早上再去解便。
4. 注意事項
 - (1) 對水楊酸製劑有過敏者禁止使用。請勿直接將泡沫擠在患部使用，以避免藥物過量發生。
 - (2) 開蓋時若有棕色結塊掉落，可取出搖勻後再使用。
 - (3) 瓶口微量結塊屬於正常現象，不影響產品品質。
 5. 藥品儲存方式
室溫乾燥避光處保存，為避免藥品懸浮液因乾涸而於瓶蓋上呈現棕褐色之結塊，建議存放時盡量瓶口朝上直立，可避免結塊形成。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138