

自費欣剋疹帶狀疱疹疫苗新藥通知



中文藥品名稱	欣剋疹帶狀疱疹疫苗
英文藥品名稱	SHINGRIX HERPES ZOSTER VACCINE
主成分及含量	Varicella Zoster Virus glycoprotein E
許可證字號	衛部菌疫輸字第 001182 號
藥廠	GlaxoSmithKline Biologicals S.A
藥品代碼	SH1103
適應症	Shingrix 適用於下列對象，以預防帶狀疱疹及其相關併發症，如疱疹後神經痛(post-herpetic neuralgia, PHN)： 50 歲(含)以上的成人 18 歲(含)以上且具有罹患帶狀疱疹風險較高的成人
用法用量	1. 初次接種時程共包含兩劑，每劑 0.5 毫升；第二劑於 第一劑施打 2 至 6 個月後施打。對免疫功能缺乏、免疫功能受到抑制或因已知疾病或治療而可能使免疫功能受到抑制的人，以及可因較短的疫苗接種時程而獲益

	<p>的人，第二劑可於第一劑施打 1 至 2 個月後施打。</p> <p>2. Shingrix 僅供肌肉注射，理想的注射部位是三角肌。</p>
注意事項	<p>1. 切勿以血管內、皮內或皮下注射的方式施打本疫苗。</p> <p>2. 不慎透過皮下途徑施打本疫苗可能會導致暫時性的局部反應增加。</p>
可能副作用	<p>頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、肌痛及注射部位疼痛、搔癢、紅腫等。</p>
交互作用	<p>與其他疫苗併用</p> <p>1. Shingrix 可與未使用佐劑的季節性流感疫苗、23 價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine, PPV23)或抗原減量的白喉-破傷風-無細胞性百日咳疫苗(diphtheria-tetanusacellular pertussis vaccine, dTpa)同時施打。</p> <p>2. 如果要將 Shingrix 和另一種注射型疫苗同時施打，一定要將兩種疫苗施打於不同的注射部位。</p>
禁忌	<p>對本疫苗的活性成份或任何組成嚴重過敏者。</p>