

二. 構音方法及位置

方 法 位置	塞音	塞擦音	擦音	鼻音	邊音
雙唇	ㄅ ㄆ			ㄇ	
唇齒			ㄝ		
舌尖	ㄉ ㄊ			ㄋ	ㄌ
舌根	ㄍ ㄎ		ㄐ		
舌面		ㄑ ㄒ	ㄔ		
舌尖後		ㄓ ㄔ ㄎ	ㄑ ㄒ		
舌尖前		ㄗ ㄘ	ㄝ		

三. 構音錯誤類型

- 替代：使用其它語音來替代目標音，如ㄉㄨㄛ → ㄍㄨㄛ
- 扭曲：目標語音扭曲，聽起來像是可是又不正確
- 省略：沒有發出目標音，如ㄍㄨㄛ → ㄨㄛ
- 贅加：自行加入語音，如ㄉㄨㄛ → ㄉㄨㄛㄨ

四. 構音錯誤方式(以較常見來舉例)

- 塞音化：以ㄉㄨㄛ來替代ㄑㄩㄛ ㄒㄩㄛ ㄓㄩㄛ ㄔㄩㄛ ㄎㄩㄛ(任一)，如ㄑㄩㄛ → ㄉㄨㄛ

- B. 前置音化：以ㄉ去來替代ㄍ，如ㄍㄠ→ㄉㄠ
- C. 舌根音化：以ㄍ來替代其它的聲母，如出ㄉ→ㄍ
- D. 塞擦音化：以ㄌㄍ替代ㄒ；以ㄒㄍ替代ㄌ，如ㄒ一→ㄌ一、ㄌㄠ→ㄒㄠ
- E. 不送氣音化：發ㄉ去ㄍ變成ㄉㄍ

五. 治療年齡

四歲以上，由單音→語詞→句子→讀文章→看圖說故事→對談練習

六. 治療活動

會依不同的構音錯誤情況選擇合適的練習方式

- A. 口腔動作練習：增加舌頭、嘴唇及口腔的肌肉靈活度
- B. 聽辨練習：可區辨音與音之間的不同
- C. 吹氣練習：區辨送氣音與不送氣音的差異
- D. 發音位置練習
- E. 發音方法練習

七. 家庭建議

- A. 做一個好的示範者，使用較慢的速度並增加說話的旋律和語調。
- B. 盡量以正面態度去鼓勵小孩，以讚美代替責罵，以說明代替處罰。
- C. 多練習治療師所提供的治療內容